Запрос ценовых предложений

КГП на ПХВ «Геологская поликлиника» Управления здравоохранения Атырауской области (г.Атырау, с.Геолог, трасса Атырау-Доссор, строение 49), объявляет о запросе ценовых предложений от потенциальных поставщиков для закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения. Закуп производится согласно Главе 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования по закупу следующих лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения.

Перечень закупаемых товаров:

№ лота	Наименование	Краткое описание и техническая характеристика	Ед.измерения	Объем закупа	Запланированные сумма
1	Набор реагентов общего белка: Реагент1х125мл +Стандарт 1х2мл	Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл Фасовка: 1х125 мл 1х2 мл стандарт общего белка	набор	12	163 320,00
2	Набор реагентов АЛТ: Реагент1 1х100мл+Реаген т2: 1х20мл	Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы	набор	8	81 680,00
3	Набор реагентов АСТ: Реагент1 1х100мл+Реаген т2: 1х20мл	Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л	набор	8	127 040,00
4	Набор реагентов Щелочной фосфатазы Реагент1 1*100мл+ Реагент2 1*20мл	Метод: кинетический Состав основного реагента после смешивания реагента 1 и реагента 2: п-нитрофенил фосфат 17 мМ Ионы магния 4 мМ Буфер (pH 10,2±0,2)	набор	3	39 780,00

		Активатор и связывающий компонент Длина волны: 405 нм Длительность анализа: 6 минут Концентрация в норме: 35-123 МЕ/л Линейность: 900 Ед/л. Для взрослых – 25-90 Ед/л при 37°С Стабильность: Рабочий реагент стабилен в течение 14 дней при 2-8 °С Фасовка: 1х 100 мл Реагент 1 1х 20 мл Реагент 2			
5	Набор реагентов Амилаза 1х125мл реагент	Метод: CNPG3, кинетика Состав основного реагента: MES 100 ммоль/л, pH 6.0 CNPG3 2.25 ммоль/л Хлорид натрия 350 ммоль/л Ацетат кальция 6 ммоль/л Тиоцианид калия 900 ммоль/л Азид натрия 0.95 г/л Длина волны: 405 нм Длительность анализа: 6 минут Концентрация альфа-амилазы в норме: 25-125 МЕ/л Линейность: 13-2400 Ед/л Фасовка: 1х125 мл реагент	набор	3	171 462,00
6	Набор реагентов Мочевина Реагент1 1*125мл+ Реагент2 1*25мл+ Стандарт 1*2мл	Состав готового раствора: Уреаза >15000 МЕ/л, Глутаматдегидрогеназа (бычья) >200 МЕ/л, АДФ >0.6 ммоль, α-Кетоглутарат 3,6 ммоль, NADH >0,28 ммоль, Буфер pH 7,8+0,1, стабилизаторы, азид натрия (0,25%) в качестве консерванта.	набор	14	219 170,00
7	Набор реагентов креатенина (со стандартом): Пикриновая кислота 1х125мл + Буфер 1х125мл + Стандарт 1х2мл	Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1х125 мл реагент R1 1х125 мл реагент R2 1х2 мл стандарт креатинина	набор	8	108 872,00
8	Набор реагентов	Метод: Триндера/уриказный, конечная	набор	3	43 482,00

	Мочевой кислоты Реагент1*125мл + Стандарт1*2мл	точка Состав основного реагента: 4-ААП 4 ммоль/л, ДХГБС 2 ммоль/л, Буфер pH 7. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 13 минут Концентрация мочевой кислоты в норме: 2,5 - 7,7 мг/дл Линейность: 0-20 мг/дл Фасовка: 1х125 мл реагент 1х2 мл стандарт мочевой кислоты			
9	Набор реагентов глюкозы Гекс: Реагент 1х125мл+ Стандарт 1х2мл	Метод: гексогиназный, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1х125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы	набор	24	435 600,00
10	Набор реагента Кальций: Колор 1х120мл+Буфер 1х120мл+Стандарт 1х5мл.	Состав основных реагентов: 1. Цветной реагент кальция (А): О-Крезолфталеиный комплексон – 0,14 мМ; 8-гидроксихинолин – 13 мМ. 2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМ, цианид калия – 2 мМ, инертные реагенты и стабилизаторы в обоих реагентах: А и В. 3. Стандарт кальция: Хлорид кальция (10 мг/дл). Длина волны: 570 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация в норме: 8,5-10,5 мг/дл Линейность: 20 мг/дл Стабильность рабочего раствора: 2 недели в холодильнике, 1 неделя при комнатной температуре Фасовка: 1х 120 мл Реагент 1 1х 120 мл Реагент 2 1х 5 мл Стандарт	набор	2	18 100,00
11	Набор реагентов Железо со стандартом для автоматических анализаторов 1х100мл буферный	Метод: Феррозин, конечная точка Состав набора: 1. Буфер-реагент железа: Гидроксиамин гидрохлорид 220 ммоль в ацетатном буфере, pH 4,5, сурфактант. 2. Окрашивающий реагент железа:	набор	3	44 907,00

	реагент + 1х10мл окрашивающий реагент + 1х5мл стандарт железа	Феррозин 16,7 ммоль в гидроксиламин гидрохлориде. Длина волны: 560 нм Линейность: 0 - 500 мкг/дл Фасовка: 1х 100 мл буферный реагент, 1х 10 мл окрашивающий реагент, 1х 5 мл стандарт железа			
12	Набор реагента Билирубина прямого: Реагент 1: 1х250мл+Билирубин прямой 1х15мл нитрит реагент +Билирубин прямой 1х3мл Калибратор	Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1.Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мМ, соляная кислота 165мМ. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мМ. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1х250мл реагент R1 1х15мл реагент R2 1х3мл калибратор билирубина	набор	6	86 400,00
13	Набор реагентов Гамма-глутамилтрансферaза (ГГТ) 1х100мл реагент R1 + 1х20мл реагент R2	Метод: кинетика Состав набора: γ-GT Buffer (R1): Трис-буфер, pH 8.25 100 ммоль/л Глицилглицин 100 ммоль/л γ-GT Субстрат (R2): L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 4.0 ммоль/л Длина волны: 405 нм Длительность анализа: 6 минут Линейность: 0- 300 Ед/л при 37°С Концентрация ГГТ в норме: Мужчины: 0 - 50 Ед/л (37°С); Женщины: 0 - 30 Ед/л (37°С) Стабильность рабочего раствора: 4 недели при 2-8°С и 5 дней при комнатной температуре (15-25°С). Фасовка: 1х100 мл реагент R1 1х20 мл реагент R2 Фасовка: 1х500 мл реагент R1 1х100 мл реагент R2	набор	2	27 500,00
14	Набор реагентов Холестерина Реагент1*125мл + Стандарт1*2мл	Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-	набор	24	354 000,00

		Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, pH 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл Линейность: 0 - 700 мг/дл Фасовка: 1х125 мл реагент 1х2 мл стандарт холестерина			
15	Набор реагентов Липопротеины высокой плотности с калибратором 1х30млреагент R1+1х10мл реагент R2+1х3мл калибратор HDL/LDL+контроль 4х3мл	Набор предназначен для количественного определения липопротеина высокой плотности (HDL) в сыворотке или плазме на автоматическом анализаторе. Используется только для in vitro диагностики. Диапазон концентраций: 2-150 мг/дл Фасовка: 1х30мл реагент R1 + 1х10мл реагент R2 + 1х3мл калибратор HDL/LDL, Реагенты: HDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 мМ, аминоантипирин – 1 ммоль/л, буфер, pH 7,0±0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, буфер, pH 7.0±0.1, сурфактант, консервант.	набор	6	532 110,00
16	Набор реагентов Триглицериды со стандартом 1х125 мл реагент + 1х5 мл стандарт триглицеридов	Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: ATP-0.5 ммоль/л, Ацетат магния-12ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза >4500Ед/л, Липаза >200,000Ед/л, Глицерокиназа >250Ед/л, Пероксидаза >2,000Ед/л, Буфер (pH 7.4) 50ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 9 минут Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л) Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л) Фасовка: 1х125 мл реагент 1х5 мл стандарт триглицеридов	набор	6	120 840,00
17	Промывающий	1. Объём флакона 1 л (Из	набор	2	18 220,00

	раствор	полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 5 % Детергент < 0,5% Протеолитический фермент < 1,0% Консервант < 0,4% Краситель < 0,001% 3. Внешний вид – прозрачная пенящаяся жидкость голубого цвета. 4.Характеристика раствора – Ферментативный. 5.Отметка на упаковке о дате изготовления.			
18	Фотометрические кюветы	из комплекта анализатора биохимического BioChem FC-200 автоматического: сегменты фотометрических кювет (160шт/упак)	уп	26	2 184 000,00
19	Набор реагентов биохимического калибратора: 1х5мл	Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1х5мл	набор	2	29 500,00
20	Набор реагентов биохимического контроля уровень (1и2) 2х5мл	Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств,	набор	2	27 216,00

		консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1х5мл Уровень 2 - 1х5мл			
21	Наконечники для дозатора	0,5-5мл универсальный, 1000шт/уп	уп	2	80 000,00
22	Пробирка	Биохимическая ПБХ 16*120	шт	1000	72 000,00
23	Набор реагентов	Набор реагентов для диагностики сифилиса в реакции микропреципитации	набор	30	1 663 200,00
24	Набор реагентов	Набор реагентов для определения гемоглобина в крови	набор	30	194 850,00
25	Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени 5х2мл, (эллаговая кислота) / HT-Coag APTT Reagent kit 5x2ml	Реагент предназначен для определения активированного частичного промбопластинового времени, а также для проведения других коагулологических тестов с использованием активатора эллаговая кислота. • АЧТВ реагент: 0,1 мл эллаговой кислоты, буферы, • соли и стабилизаторы. • Кальция хлорид (0,025М) не входит в состав набора и приобретается отдельно. Открытый реагент стабилен в течение 30 дней при температуре + 2 до + 8.	набор	50	453 600,00
26	Кальция хлорид, набор реагентов 10x2ml / HT-Coag Calcium Chloride Reagent kit 10x2 ml	• Реагент предназначен для использования совместно с набором реагентов для определения АЧТВ в системе свертывания крови. • Кальция хлорид (CaCl2) 0.025М • Кальция хлорид (0.025 М): 0,025М раствор хлорида кальция, 0,1% азида натрия и стабилизаторы. Открытый реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Фасовка: 10×2.0 мл	набор	50	365 500,00
27	Набор реагентов для определения содержания фибриногена (Тромбин для определения содержания фибриногена 6х2мл, Референсная плазма для определения	Тромбин реагент (для определения фибриногена) 6×2.0 мл Референсная плазма (для определения фибриногена) 1×1.0мл Раствор имидазолового буфера (IBS) 2×75.0мл Открытый реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8.	набор	50	3 056 900,00

	фибриногена 1х1мл, Буфер имидазоловый 2х75мл, Тромбин для определения содержания фибриногена (for Fib Assay)				
28	Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5х2мл/ HT-Coag PT Reagent kit 5x2ml	Набор предназначен для определения протромбинового времени (ПТВ) и анализа для факторов II, V, VII, и X для калибровки испытаний свертывания крови на системе коагуляции • рекомбинантный человеческий тромбопластин (<1мкг/мл), • фосфолипиды, • кальция хлорид, • буферы, • соли и стабилизаторы Открытый реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8.	набор	30	377 400,00
29	Набор реагентов для определения Тромбинового времени 5х2мл, / HT-Coag Thrombin Time Reagent kit 5x2ml	Тромбин реагент содержит: • жидкий стандартизованный бычий • тромбин, бычий альбумин, • буферы и стабилизаторы. Открытый реагент стабилен в течении 30 дней при температуре + 2 до + 8.	набор	50	945 000,00
30	Контроль 1, набор реагентов 1х1мл / HT-Coag Control 1 Reagent kit 1x1ml	• Материал получен из человеческой плазмы, антикоагулянта цитрата натрия (0,4%) • Стабилизаторы и буферы с лиофилизацией (<1,0%) • Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. • Фасовка: Набор -1х1мл	набор	2	20 996,00
31	Кюветы реакционные 700штук в упаковке для коагулометра TS1000, TS4000	Емкость для измерения свертываемости крови Пластик 2,94 г Соединены по 4 штуки 30 * 65 * 16 мм 12 *12 мм	уп	5	450 000,00
32	Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка 1600шт в упаковке для TS1000, TS4000	Используются для определения свертываемости крови в анализаторе Металл 55 мг 0,24 см	уп	3	280 800,00
33	Эритротест цоликлон анти А	10 мл	фл	20	20 720,00
34	Эритротест цоликлон АВ	10 мл	фл	40	73 080,00

35	Эритротест цоликлон анти В	10 мл	фл	20	20 720,00
36	Эритротест цоликлон Д супер	10 мл с капильницей для определения резус фактора	фл	40	89 920,00
37	Набор реагентов	С-реактивный белок лантекс-тест на слайде, 100 определений	набор	12	73 740,00
38	Тест-полоски для измерения показателей в моче	Предназначена для измерения одиннадцати показателей: удельный вес (плотность), лейкоциты, нитриты, кислотность (pH), белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, кровь (эритроцты и гемоглобин), компенсационная зона в моче. В упаковке 100 тест-полосок	уп	300	4 350 000,00
39	Романовский жидкий А-Э	Жидкий Азур-Эозин	л	1	5 000,00
40	Уксусная кислота	Концентрат	кг	1	5 000,00
41	Экспресс тест	Экспресс тест на ВИЧ-1/2	набор	5	37 500,00

Адрес Заказчика: 060016, г.Атырау, с.Геолог, тр.Атырау-Доссор, строение 49.
Товар(ы) должны поставляться: г.Атырау, с.Геолог, тр.Атырау-Доссор, строение 49.
График поставок: согласно графика поставки к договору.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP.
Место представления (приема) документов: г.Атырау, с.Геолог, тр.Атырау-Доссор, строение 49 (Здание КГП на ПХВ «Геологская поликлиника» Управления здравоохранения Атырауской области», 2 этаж, кабинет юриста (№256).
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 26 марта 2018 г. в 12.30 ч. включительно.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 26 марта 2018г. в 15.00 ч. в кабинете заместителя главного врача (№252) здания КГП на ПХВ «Геологская поликлиника» Управления здравоохранения Атырауской области.

И.о. директора
КГП на ПХВ «Геологская полкилиника» **Сайнова Г.С.**